

コミナティ(ファイザー社) または  
COVID-19 ワクチンモデルナ(武田薬品)について

65歳以上の方(昭和32年4月1日以前に生まれた方)へ

# 新型コロナワクチン接種の お知らせ



未来につながる新型コロナ対策が、ひとつ増えました。

新型コロナワクチンは、発症を予防し、  
重症者や死亡者の発生をできる限り減らすことを目的としています。

ワクチンの種類は複数あります。あなたがどのワクチンを接種するかは、予約の際にご確認ください。

## 新型コロナワクチンの有効性と安全性

コミナティ(ファイザー社) および COVID-19 ワクチンモデルナ(武田薬品)について

### ◎ワクチンの効果 :

#### 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による感染症の予防

メッセンジャーRNAワクチンという種類のワクチンです。ワクチンを受けた人の方が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症(※)を発症した人が少ないということがわかっています。

(発症予防効果は約95%と報告されています。)

(※)新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、症状が重くなると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。



### ◎ワクチンの安全性 :

#### ■接種後、数日以内に現れる可能性がある症状

発現割合	症 状	
	コミナティ(ファイザー社)	モデルナ(武田薬品)
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛	接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛
10-50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ	関節痛、悪寒、吐き気・嘔吐、リンパ節腫大、発熱、接種部位の腫れ、発赤・紅斑
1-10%	吐き気、嘔吐	接種後7日目以降の接種部位の痛みなど(※)

コミナティ添付文書、COVID-19 ワクチンモデルナ添付文書より

(※)接種部位の痛みや腫れ、紅斑

- ・接種直後よりも翌日に痛みを感じている方が多いです。
  - ・これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。
  - ・疲労や関節痛、発熱など、1回目より2回目の方が、頻度が高くなる症状もあります。
  - ・接種後すぐにアナフィラキシーや血管迷走神経反射が起こる可能性があります。
- 詳しくは4ページをご参照ください。

## ワクチンを受けるのに注意が必要な方など

◎以下に当てはまる方は、ワクチンを受けることができない場合や、注意が必要な場合があります。接種に不安がある方は、かかりつけ医等にワクチンを受けて良いかどうかご相談ください。

受けることができない方	<ul style="list-style-type: none"> <li>○明らかな発熱がある方や、重い急性疾患にかかっている方</li> <li>○ワクチンの成分(※1)に対し、重度の過敏症を起こしたことのある方</li> </ul>
注意が必要な方	<ul style="list-style-type: none"> <li>○現在、何らかの病気で治療中の方           <ul style="list-style-type: none"> <li>・心臓病、腎臓病、肝臓病、血液疾患、免疫不全で治療中の方</li> <li>・血が止まりにくい病気の方や、血をサラサラにする薬(※2)を飲んでいる方</li> </ul> </li> <li>○以下の様な症状が出たことがある方           <ul style="list-style-type: none"> <li>・薬や食品に対する重いアレルギー症状</li> <li>・けいれん(ひきつけ)</li> </ul> </li> </ul>

(※1) ポリエチレングリコールなどが成分として含まれます。ポリエチレングリコールは、大腸内視鏡検査時に下剤として使用する医薬品を始め、様々な医薬品に添加剤として含まれており、化粧品にも含まれていることがあります。その他の成分や、詳細については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

(※2) このワクチンは、筋肉内に注射をします。そのため、抗凝固薬(ワーファリン®、プラザキサ®、イグザレルト®、エリキュース®、リクシアナ®)を内服中の方は、接種後の出血に注意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。

受ける方の同意なく、接種が行われることはできません。  
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。



## ワクチンを受ける当日について

### ◎ワクチンを受ける前の注意点

- 接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約した市町村の窓口や医療機関にご連絡ください。

通常、上腕の三角筋に注射するため

肩を出しやすい服装でお越しください。




### ◎ワクチンを受けた後の注意点

接種会場にて

ワクチンを受けた後は、15分以上は  
接種会場で座って様子をみてください(※)。

※過去にアナフィラキシーを含む、重いアレルギー症状を起こしたことのある方や、採血等で気分が悪くなったり、失神等を起こしたことがある方は、30分ほどお待ちください。



### ■接種後、すぐに現れる可能性のある症状について

#### ○アナフィラキシー

- 薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。
- じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が、急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下(呼びかけに反応しない)を伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。
- 起こることはまれですが、接種後にもしアナフィラキシーが起つても、すぐに対応が可能なよう、ワクチンの接種会場や医療機関では、適切な医療体制を整備しています。

#### ○血管迷走神経反射

- ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失うことがあります。
- 誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常、横になって休めば自然に回復します。
- 倒れてケガをしないように、背もたれのある椅子に座って様子をみてください。

(※) 接種後、数日以内に現れる可能性がある症状については、2ページをご参照ください。

## ワクチンを受けた後について

ワクチンは通常、同じワクチンを2回接種します。

接種する間隔	
コニナティ(ファイザー社)	モデルナ(武田薬品)
3週間	4週間

- 2回目の予約方法については、1回目に受けた医療機関・接種会場や市町村の案内をご確認ください。
- 接種後に現れた症状の種類によっては、2回目の接種は控えた方がよいこともあります。接種後に気になる症状が現れた方は、2回目を受けるかどうかも含めて、ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医にご相談ください。


ワクチンを受けた後も

マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします

ワクチンを受けた方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、他の方への感染をどの程度予防できるかはまだ十分には分かっていません。また、ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、すぐに多くの方が予防接種を受けられるわけではなく、ワクチンを受けた方も受けていない方も、共に社会生活を営んでいくことになります。

**このため、皆さんに感染予防対策を継続していただくようお願いします。**


具体例 )



密集場所



密接場面



密閉空間

「3つの密(密集・密接・密閉)」の回避



マスクの  
着用



石けんによる  
手洗い



アルコールによる  
消毒の励行

## ワクチン接種の申し込み方法

### ■ 「接種券」を確認する

新型コロナワクチンは、①医療従事者、②高齢者（65歳以上）、  
③基礎疾患のある方等から順次接種を開始する予定です。65歳  
以上の方に、お住まいの市町村から「接種券」が届きますので、  
同封の案内をよく読んで、接種の準備を進めてください。



### ■ 医療機関/接種会場を探す

市町村からの広報やインターネットで、ワクチンを受けること  
ができる医療機関や接種会場を探しましょう。

接種総合案内サイト  
「コロナワクチンナビ」

サイトアドレス：  
<https://v-sys.mhlw.go.jp>



### ■ 予約する ワクチンを受けたい医療機関／市町村にお問い合わせください。

#### ■ 当日の持ち物を準備する

- ・接種券（はがさず台紙ごとお持ちください）
- ・本人確認書類  
(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証 等)



「接種券」(例)



マイナンバーカード 等

※医療機関や接種会場が探せない場合や、ご不明な点がある場合など、お住まいの市町村にお問い合わせ  
をすることができます。

※「接種券」は市町村から送付されます。

※予約時に接種するワクチンの種類をご確認ください。

### ◎住民票がある場所（住所地）以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 ➔ 医療機関や施設でご相談ください。
- ・基礎疾患の治療を行っている医療機関でワクチンを受ける方 ➔ 医療機関でご相談ください。
- ・お住まいが住所地と異なる方 ➔ 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります（※）。
- ・自衛隊や都道府県が設置する大規模接種会場でワクチンを受ける方  
➔ 対象地域の方は、住所地外の市町村でもワクチンを受けることができます。

（※）「住所地外接種届出済証」が必要になります。コロナワクチンナビでご確認いただくか、実際にお住まい  
の市町村の相談窓口にお問い合わせください。

## ご相談先など

### ◎新型コロナワクチンに関する相談先

ワクチン接種後に 体に異常があるとき	→ ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、 市町村や都道府県の窓口
ワクチン接種全般に に関するお問い合わせ	→ 市町村の窓口

### ◎予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になつたり障害が残つたりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金の給付など）が受けられます。

申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

### 新型コロナワクチンに便乗した詐欺にご注意ください！

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個人情報をだましとろうとする電話に関する相談が消費生活センターへ寄せられています。

市町村等が、ワクチン接種のために金銭  
や個人情報を電話・メールで求めることは  
ありません。

困ったときは一人で悩まず、消費者ホットライン  
188（局番なし）にご相談ください。





新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索

ホームページをご覧になれない場合は、  
お住まいの市町村等にご相談ください。

